



Description

La ficairie printanière est une plante herbacée vivace à cycle végétatif très court. Les feuilles luisantes et cordiformes apparaissent dès janvier-février et disparaissent totalement dans le courant du mois de mai. Les tiges blanchâtres d'une trentaine de centimètres environ sont plus ou moins couchées à la surface du sol. Les fleurs solitaires s'épanouissent courant mars-avril à l'extrémité d'un long pédoncule. Elles possèdent trois sépales vert-jaune et des pétales jaune cireux brillants en nombre variable (8 à 12 en règle générale). Ils possèdent une petite fossette nectarifère à leur base. L'appareil reproducteur est typique de la famille des renonculacées avec de nombreuses étamines et de nombreux pistils libres serrés les uns contre les autres. En général les fleurs sont stériles.

Les racines fasciculées et tubérisées rappellent en miniature, la souche d'un dahlia.


Les botanistes distinguent de nombreuses sous-espèces qui se différencient par leur taille, leur port, l'absence de bulbilles à l'aisselle des feuilles...

La saviez-vous ?

Comme la plupart des renonculacées, la ficairie fausse renoncule est une plante toxique qui, malgré sa richesse en vitamine C, doit être évitée en usage interne. Une pommade préparée à partir de saindoux et de suc de tubercules préalablement séchés sert à soulager les hémorroïdes.



Les racines évoquent celles du dahlia



Les abeilles visitent les fleurs de la ficairie